

治療翌日あるいは翌々日、(1-2週間後)、1か月後、3か月後、(6か月後)

注意:カッコ内は医師の判断で必要のある方のみに行います。

治療後の生活について(高周波血管内焼灼術の場合)

		瘤切除の有無	開始目安
生活・仕事	通常の生活		治療直後から
	事務仕事		翌日から
	肉体労働		3日後から
移動	車の運転		翌日から
	自転車		5日後から
清潔	シャワー	なし	翌日から
		あり	2日後から
	入浴	なし	2日後から
		あり	5日後から
その他	温泉・プール		1週間後から
	飛行機		2週間後から
	スポーツ		2週間後から
	サウナ		1か月後から
	マッサージ(治療あり)		1か月後から
	飲酒		翌日から
	長時間の正座		1か月後から

治療後の生活について(血管内塞栓術・グルー治療の場合)

		瘤切除の有無	開始目安
生活・仕事	通常の生活		治療直後から
	事務仕事		翌日から
	肉体労働		3日後から
移動	車の運転		翌日から
	自転車		翌日から
清潔	シャワー	なし	翌日から
		あり	2日後から
	入浴	なし	翌日から
		あり	5日後から
その他	温泉・プール・サウナ		1週間後から
	旅行(飛行機)		翌日から
	スポーツ		2週間後から
	マッサージ(脚)		1か月後から
	飲酒		翌日から
	長時間の正座		1か月後から